



# Tratamiento de soporte del cáncer de mama



**El cáncer de mama (CM) es la neoplasia maligna más frecuente a escala global.<sup>1</sup>**



- El pronóstico de las pacientes con CM metastásico (estadio IV) ha mejorado en los últimos años.<sup>2</sup>
- Además de un mejor diagnóstico, se dispone de nuevas opciones de tratamiento sistémico.<sup>2</sup>
- Como resultado, la supervivencia se ha optimizado con el cambio de paradigma terapéutico, que podría considerarse una terapia crónica de mantenimiento.<sup>2</sup>
- En las pacientes con CM metastásico, la potencial progresión de la enfermedad puede ponerse identificarse a partir de la evidencia de crecimiento o empeoramiento en los sitios anatómicos ya comprometidos, o bien por la aparición de nuevas metástasis.<sup>3</sup>

**Variables que sugieren progresión de la enfermedad<sup>3</sup>**

<b>Empeoramiento de síntomas (dolor, disnea)</b>	<b>Deterioro del estado funcional</b>	<b>Empeoramiento o nueva evidencia de enfermedad al examen físico</b>
Pérdida de peso inexplicable	Aumento de los parámetros del hepatograma	Hipercalcemia

<b>Empeoramiento de síntomas (dolor, disnea)</b>	<b>Deterioro del estado funcional</b>	<b>Empeoramiento o nueva evidencia de enfermedad al examen físico</b>
Nuevos hallazgos radiológicos o aumento de las lesiones previas	Nuevas anomalías en los hallazgos de imágenes funcionales	Aumento de los biomarcadores tumorales

- El control tanto de la enfermedad como de las manifestaciones clínicas mediante el tratamiento de soporte es parte de un abordaje interdisciplinario que involucra a la paciente y su entorno.<sup>4</sup>

#### **Abordaje del CM metastásico en etapas avanzadas<sup>4</sup>**

Beneficios y riesgos del tratamiento oncológico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Historia natural de la enfermedad</li> <li>• Potencial respuesta</li> <li>• Potenciales toxicidades del tratamiento</li> <li>• Estado general y comorbilidades</li> </ul>	Terapia oncológica
Expectativas y valores de la paciente y su entorno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decisión compartida con la paciente y su entorno</li> <li>• Calidad de vida</li> </ul>	Preparación de la paciente y su familia para el final de la vida
Manejo de los síntomas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dolor</li> <li>• Disnea</li> <li>• Anorexia y Caquexia</li> <li>• Náuseas, Vómitos, Constipación</li> <li>• Diarrea</li> <li>• Fatiga, Cansancio, Astenia</li> <li>• Delirio</li> </ul>	Intervenciones específicas para el enfoque de la síntomas

- El dolor es una manifestación destacada del CM metastásico que requiere de un tratamiento de soporte adecuado, el cual difiere en función de la expectativa de vida de la paciente.<sup>4</sup>

#### **Tratamiento del dolor en las pacientes con CM metastásico<sup>5</sup>**

Síndromes dolorosos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metástasis óseas (el más frecuente)</li> <li>• Infiltración de la pared torácica</li> <li>• Compromiso de plexos</li> <li>• Cefalea (metástasis cerebrales)</li> <li>• Dolor abdominal (secundarismo hepático)</li> </ul>
Tratamiento multimodal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terapia oncológica (quimioterapia, terapia hormonal, radioterapia, cirugía)</li> <li>• Analgésicos con efectos sobre el dolor somático (opiáceos) o neuropático (anticonvulsivos, antidepresivos)</li> <li>• Corticoides</li> </ul>
Casos especiales	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compresión epidural</li> <li>• Causas iatrogénicas</li> </ul>

- La corrección de la hipoxemia y el uso de opiáceos son las terapias de elección en caso de disnea, si bien ciertas causas de este síntoma pueden requerir tratamientos específicos, en función de la etiología.<sup>5</sup>

#### Tratamiento específico de la disnea en función de la causa<sup>5</sup>

Etiología subyacente	Terapia sugerida
Anemia	Transfusión
Broncoespasmo	Uso de broncodilatadores
Infecciones respiratorias	Antibióticos
Embolia pulmonar	Anticoagulación
Derrame pleural	Toracocentesis
Neumonitis, linfangitis	Corticoides

## Etiología subyacente

Insuficiencia cardíaca

## Terapia sugerida

Diuréticos

- **Las pacientes con CM avanzado y sus familias tienen necesidades complejas que pueden provocar deterioro de la calidad de vida.**<sup>5</sup>
- **La mejoría del bienestar de estas pacientes requiere del enfoque detallado mediante terapias paliativas y de sostén, por parte de un equipo interdisciplinario.**<sup>5</sup>

---

### Referencias:

[1] Organización Mundial de la Salud. Cáncer de mama. Disponible en:

<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/breast-cancer> (consultado en diciembre de 2021).

[2] Neuman HB, Morrogh M, Gonen M, Van Zee KJ, Morrow M, King TA. Stage IV breast cancer in the era of targeted therapy: does surgery of the primary tumor matter? *Cancer*. 2010; 116(5):1226-1233.

[3] National Comprehensive Cancer Network (NCCN) Guidelines. Breast Cancer, version 1.2022. Disponible en: [https://www.nccn.org/professionals/physician\\_gls/pdf/breast.pdf](https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/breast.pdf) (consultada en diciembre de 2021).

[4] National Comprehensive Cancer Network (NCCN) Guidelines. Palliative Care, version 2.2021. Disponible en: [https://www.nccn.org/professionals/physician\\_gls/pdf/palliative.pdf](https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/palliative.pdf) (consultada en diciembre de 2021).

[5] Cherny NI, Paluch-Shimon S, Berner-Wygoda Y. Palliative care: needs of advanced breast cancer patients. *Breast Cancer (Dove Med Press)*. 2018; 10: 231-243.

---

Elaborado por: Agencia Médica para Dr. Reddy's Chile DRL-CHL-54-1022-01

Material para uso exclusivo de los profesionales de la salud.