

Doxlox^{®1}

Doxorubicina Liposomada



Composición y Presentaciones:

Estuche con 1 frasco ampolla con Dispersión Coloidal Pegilada Inyectable conteniendo 20 mg / 10 mL del activo Doxorubicina.

Indicaciones

Doxlox está indicado para:

- 1.- Tratamiento de Sarcoma de Kaposi asociado con el SIDA en pacientes con recuento de linfocitos inferior a 200 linfocitos/mm³ y daño mucocutáneo o visceral extenso
- 2.- Tratamiento de pacientes con Carcinoma metastásico de mama en los que existe un riesgo cardíaco aumentado.
- 3.- Tratamiento en el Cáncer de ovario recurrente, después de una quimioterapia basada en platino.
- 4.- En combinación con bortezomib para el tratamiento de pacientes con mieloma múltiple que no hayan recibido previamente bortezomib y han recibido al menos una terapia previa

Equivalencia Terapéutica:

Producto Bioequivalente



Vía administración:

Intravenosa (Parenteral)

Período de Eficacia:

20 meses

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar entre 2°C y 8°C, sin congelar. La solución diluida es estable por 4 horas cuando se almacena a 25 ° C y durante 36 horas cuando se almacena a 2-8 °C ambas en suero glucosado.

Envase primario:

Estuche que contiene frasco ampolla de vidrio, transparente, incoloro, tipo I USP, con goma de bromobutilo y sello flip -off.



La Buena
Salud
No Puede
Esperar

Referencias:

1: Información de Registro Sanitario disponible en <https://registrosanitario.ispch.gob.cl/Ficha.aspx?RegistroISP=F-24723/19>